

# Doses vacina HPV Nonavalente

Idade	Passado vacinal	Recomendação
9 a 14 anos	Sem histórico de HPV quadrivalente	Duas doses de HPV nonavalente (0-6 meses). O intervalo mínimo é de 5 meses.
	Uma dose de HPV quadrivalente	6 meses após a dose de HPV quadrivalente, iniciar o esquema vacinal de 2 doses de HPV nonavalente (0-6 meses). O intervalo mínimo é de 5 meses.
	Duas doses de HPV quadrivalente	12 meses após a segunda dose de HPV quadrivalente, iniciar o esquema vacinal de 2 doses de HPV nonavalente (0-6 meses). O intervalo mínimo é de 5 meses.
15 a 45 anos	Sem histórico de HPV quadrivalente	Três doses de HPV nonavalente (0-2-6 meses)
	Uma dose de HPV quadrivalente	2 meses após a dose de HPV quadrivalente, iniciar o esquema vacinal de 3 doses de HPV nonavalente (0-2-6 meses).
	Duas doses de HPV quadrivalente	3 meses após a segunda dose de HPV quadrivalente, iniciar o esquema vacinal de 3 doses de HPV nonavalente (0-2-6 meses).
	Três doses de HPV quadrivalente	12 meses após a segunda dose de HPV quadrivalente, iniciar o esquema vacinal de 3 doses de HPV nonavalente (0-2-6 meses).

\*Fonte: Sociedade Brasileira de Imunizações