

CALENDÁRIO VACINAL 2024/2025 | Do nascimento à terceira idade



VACINAS	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 a 19 anos	20 a 49 anos	50 a 59 anos	A partir de 60 anos	Gratuitas na rede pública	Clínicas privadas	Nos CRIEs*				
BCG ID	Uma dose	Vacinar os não vacinados anteriormente												Vacinar pessoas contactantes de hanseníase										Sim	Sim	Não			
Hepatite B	Três ou quatro doses a partir do nascimento						Vacinar os não vacinados anteriormente																		Sim	Sim	Sim		
Rotavírus	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VR1 ou VR5). Iniciar vacinação antes das 15 semanas de vida.						CONTRAINDICADA																		Sim	Sim	Não		
Tríplice Bacteriana (DTPw, DTPa ou dTpa)	Três doses (DTPa ou DTPw) iniciando aos 2 meses de idade						REFORÇO	REFORÇO		Reforço com DTPa, DTPw ou dTpa		Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou, na impossibilidade de dTpa, usar dT)										Sim, DTPw e dT; dTpa para gestantes e profissionais da saúde	Sim, DTPa e dTpa	Sim, DTPa					
Haemophilus influenzae b	Três doses iniciando aos 2 meses de idade						REFORÇO	Vacinar os não vacinados anteriormente		Vacinar pessoas em situações especiais de risco										Sim, três primeiras doses	Sim	Sim							
Poliomielite (vírus inativados)	Três doses iniciando aos 2 meses de idade						REFORÇO	REFORÇO		Vacinar pessoas em situações especiais de risco										Sim, três primeiras doses	Sim	Sim							
Pneumocócicas Conjugadas	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VPC10, VPC13 ou VPC15), iniciando aos 2 meses de idade						REFORÇO	VPC10, VPC13 ou VPC15: vacinar os não vacinados anteriormente		VPC13 ou VPC15: vacinar pessoas em situações especiais de risco				VPC13 ou VPC15: uma dose				Sim, VPC10, menores de 5 anos	Sim	Sim, VPC10 e VPC13									
Meningocócica Conjugada ACWY ou C	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade						REFORÇO	REFORÇO		Para não vacinados até 15 anos, duas doses com intervalo de cinco anos. A partir de 16 anos, uma dose.		Vacinar pessoas em situações especiais de risco										Sim, menC para menores de 5 anos e menACWY de 11 a 14 anos	Sim	Sim, menC e menACWY					
Meningocócica B	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade						REFORÇO	Para os não vacinados anteriormente: duas ou três doses de acordo com a faixa etária e a vacina utilizada				Vacinar pessoas em situações especiais de risco				Não	Sim	Não											
Poliomielite Oral (vírus vivos atenuados)	CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO																						Sim	Não	Não				
Influenza (gripe)	VACINAÇÃO ANUAL																		Sim, para menores de 5 anos e maiores de 60 anos				Sim	Sim					
Febre Amarela							Duas doses: aos 9 meses de vida e aos 4 anos de idade. Recomendação da SBlm: Como há possibilidade de falha vacinal mesmo para quem receber a primeira dose a partir dos 5 anos, a SBlm recomenda uma segunda dose dez anos após.																		Sim	Sim	Não		
Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola)							Duas doses a partir dos 12 meses		Vacinar os não vacinados anteriormente										Vacinar pessoas em situações especiais de risco				Sim, até 59 anos	Sim	Não				
Varicela (catapora)							Duas doses a partir dos 12 meses		Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente										Vacinar pessoas em situações especiais de risco				Sim	Sim	Sim				
Hepatite A							Duas doses a partir dos 12 meses		Vacinar os não vacinados anteriormente										Vacinar pessoas em situações especiais de risco				Sim, uma dose para menores de 5 anos	Sim	Sim				
HPV Nonavalente**													Duas doses para meninas e meninos		De 20 anos em diante: três doses.		Vacinar não vacinados e pessoas em situações especiais de risco, a critério médico (três doses)										Não	Sim	Não
Pneumocócica 23-Valente													Vacinar pessoas em situações especiais de risco										Duas doses com intervalo de cinco anos				Não	Sim	Sim
Herpes zoster													A partir dos 18 anos, vacinar pessoas em situações especiais de risco				Rotina a partir dos 50 anos				Não	Sim	Não						
Dengue													Qdenga® é recomendada entre 4 e 60 anos (independentemente de contato prévio com o vírus da dengue), em duas doses com intervalo de 3 meses entre elas. Dengvaxia® é recomendada entre 6 e 45 anos (somente para soropositivos para dengue), em 3 doses com intervalo de 6 meses entre elas.										Sim, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde				Sim	Não	
Covid-19	Consultar orientações do Ministério da Saúde																												
Nirsevimabe***	Dose única universal para ≤ 12 meses na primeira sazonalidade																								Não	Sim	Não		
Arexvy																			Dose única, a qualquer momento, independentemente da sazonalidade				Não	Sim	Não				

*Consultar manual do CRIE em <https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/publicacoes/manual-dos-centros-de-referencia-para-imunobiologicos-especiais-6a-dicao> (acesso em 03.04.2024)

**Para vacina contra HPV quadrivalente, consultar orientações do Ministério da Saúde. Sobre intercambialidade entre vacinas, consultar orientações do fabricante e sociedades.

***Em crianças que fazem parte do grupo de risco, deve ser realizada mais uma dose na segunda sazonalidade.

