CALENDÁRIO VACINAL 2024/2025 | Do nascimento à terceira idade

VACINAS	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 a 19 anos	20 a 49 anos	50 a 59 anos	A partir de 60 anos	Gratuitas na rede pública	Clínicas privadas	Nos CRIEs*
BCG ID	Uma dose	Vacinar os não vacinados anteriormente														Vacinar pessoas contactantes de hanseníase							Sim	Sim	Não
Hepatite B	Três ou quatro doses a partir do nascimento							Vacinar os não vacinados anteriormente															Sim	Sim	Sim
Rotavírus		Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VR1 ou VR5). Iniciar vacinação antes das 15 semanas de vida.						CONTRAINDICADA															Sim	Sim	Não
Tríplice Bacteriana (DTPw, DTPa ou dTpa)		Três doses (DTPa ou DTPw) iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO			Reforço com DTPa, DTPw ou dTpa			Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou, na impossibilidade de dTpa, usar dT)				Sim, DTPw e dT; dTpa para gestantes e profissionais da saúde	Sim, DTPa e dTpa	Sim, DTPa
Haemophilus influenzae b		Três doses iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO		Vacinar os não vacinados anteriormente	Vacinar pessoas em situações especiais de risco								Sim, três primeiras doses	Sim	Sim
Poliomielite (vírus inativados)		Três doses iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO	Vacinar os não vacinados anteriormente		REFORÇO			Vacinar pessoas em situações especiais de risco					Sim, três doses aos 2, 4 e 6 meses e um reforço aos 15 meses	Sim	Sim
Pneumocócicas Conjugadas		Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada - VPC20, VPC15, VPC13 ou VPC10 (PNI) -, iniciando aos 2 meses de idade									REFORÇO		VPC20, VPC15, VPC13 ou VPC10 (PNI): vacinar os não vacinados anteriormente				VPC20, VPC15 ou VPC13: vacinar pessoas em situações especiais de risco			VPC20: uma dose VPC15 ou VPC13: uma dose + reforço com VPC23 com intervalo mínimo de 2 meses	Sim, VPC10, menores de 5 anos	Sim	Sim, VPC10 e VPC13
Pneumocócica 23-Valente															Vacinar pessoas em situações especiais de risco							Duas doses com intervalo de cinco anos	Não	Sim	Sim
Meningocócica Conjugada ACWY ou C			Duas doses iniciando aos 3 meses de idade								REFORÇO					REFORÇO			Para não vacinados até 15 anos, duas doses com intervalo de cinco anos. A partir de 16 anos, uma dose.			Vacinar pessoas em situações especiais de risco	Sim, menC para menores de 5 anos e menACWY de 11 a 14 anos	Sim	Sim, menC e menACWY
Meningocócica B			Duas doses iniciando aos 3 meses de idade								REFORÇO		Para os não vacinados anteriormente: duas ou três doses de acordo com a faixa etária e a vacina utilizada								Vacinar pessoas em situações especiais de risco		Não	Sim	Não
Influenza (gripe)																			VACINAÇÃO ANUAL				Sim, trivalente para menores de 5 anos e maiores de 60 anos	Sim, tri ou tetravalente e HD4V (60 anos ou +)	Sim, trivalente
Febre Amarela																			Duas doses: aos 9 meses de vida e aos 4 anos de idade. / **Recomendação do PNI:** se recebeu a primeira dose antes dos 5 anos, indicada uma segunda dose, independentemente da idade atual. Se aplicada a partir dos 5 anos: dose única. / **Recomendação da SBIm:** duas doses. Como há possibilidade de falha vacinal mesmo para quem receber a primeira dose a partir dos 5 anos, a SBIm recomenda uma segunda dose dez anos após. / Essa vacina pode ser exigida para emissão do CIVP, atendendo exigências sanitárias de alguns destinos internacionais. Nesse caso, deve ser aplicada até dez dias antes de viajar.				Sim	Sim	Não
Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola)										Duas doses a partir dos 12 meses					Vacinar os não vacinados anteriormente							Vacinar pessoas em situações especiais de risco	Sim, até 59 anos	Sim	Não
Varicela (catapora)										Duas doses a partir dos 12 meses					Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente							Vacinar pessoas em situações especiais de risco	Sim	Sim	Sim
Hepatite A										Duas doses a partir dos 12 meses					Vacinar os não vacinados anteriormente							Vacinar pessoas em situações especiais de risco	Sim, uma dose para menores de 5 anos	Sim	Sim
HPV**																		Duas doses com intervalo mínimo de seis meses entre elas		Vacinar adultos com três doses (0-1 a 2-6 meses)		A critério médico, vacinar pessoas em situações especiais de risco com três doses (0-1 a 2-6 meses)	Sim, uma dose de HPV4 para meninas e meninos de 9 a 14 anos	Sim, HPV9	Sim, três doses de HPV4 para mulheres e homens até 45 anos pertencentes a grupos especiais
Herpes Zoster																			Duas doses com dois meses de intervalo. A partir dos 18 anos, vacinar pessoas em situações especiais de risco.			Duas doses com dois meses de intervalo. Rotina a partir dos 50 anos.	Não	Sim	Não
Dengue***															Qdenga® é a vacina preferencial, recomendada entre 4 e 60 anos (independentemente de contato prévio com o vírus da dengue), em duas doses com intervalo de três meses entre elas. Dengvaxia® é recomendada entre 6 e 45 anos (somente para soropositivos para dengue), em três doses com intervalo de seis meses entre elas.						Sim, Qdenga® para 10 a 14 anos	Sim	Não
Covid-19																			Consultar orientações do Ministério da Saúde						
VSR																						Vacina VSR**** - Uma dose	Não	Sim	Não
		Nirsevimabe - Dose única para ≤ 1 ano na primeira sazonalidade										Imunizar crianças em situações especiais de risco													

*Consultar manual do CRIE em **https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/publicacoes/manual-dos-centros-de-referencia-para-imunobiologicos-especiais-6a-dicao (acesso em 22.11.2024)**
**Esquemas vacinas HPV - SBIm: duas doses de HPV9 dos 9 aos 19 anos e três doses de 20 anos em diante. Febrasgo (bula): duas doses de HPV9 dos 9 aos 14 anos e três doses dos 15 anos em diante. PNI: uma dose de HPV4 dos 9 aos 14 anos (temporariamente até 19 anos).
***Notas técnicas do MS: **https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-az/d/dengue/notas-tecnicas**
****Arexvy® (GSK) e Abrysvo® (Pfizer) uma dose, aplicar a qualquer momento, independentemente da sazonalidade. Em idosos de 60-69 anos, em condições de risco e de rotina para > 70 anos.

Rotina | Vacinar não vacinados | Situações especiais | Contraindicada

Fonte: Sociedade Brasileira de Imunizações I Calendário 2024/2025 • Beep Serviços Médicos LTDA I CNPJ 28.286.170/0001-01 I Responsável técnico: Dr. Vander Corteze - CRM 85363-1/RJ