



CALENDÁRIO VACINAL 2025/2026

VACINAS	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 a 19 anos	20 a 49 anos	50 a 59 anos	A partir de 60 anos	Gratuitas na rede pública	Clínicas privadas	Nos CRIE*		
BCG ID	Uma dose	Vacinar os não vacinados anteriormente														Vacinar pessoas contactantes de hanseníase							Sim	Sim	Não		
Hepatite B	Três ou quatro doses a partir do nascimento							Vacinar os não vacinados anteriormente																	Sim	Sim	Sim
Rotavírus		Vacina rotavírus monovalente: duas doses aos 2 e 4 meses de idade. Vacina rotavírus pentavalente: três doses aos 2, 4 e 6 meses de idade							Vacinar os não vacinados anteriormente D1 até 11 meses e 29 dias e última dose até 23 meses e 29 dias					CONTRAINDICADA										Sim	Sim	Não	
Tríplice Bacteriana DTPw, DTPa ou dTpa)		Três doses (DTPa ou DTPw) iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO		Reforço com DTPa, DTPw ou dTpa	Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou, na impossibilidade de dTpa, usar dT)							Sim, DTPw e dT; dTpa para gestantes e profissionais da saúde	Sim, DTPa e dTpa	Sim, DTPa			
Haemophilus influenzae b		Três doses iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO	Vacinar os não vacinados anteriormente	Vacinar pessoas em situações especiais de risco							Sim, três primeiras doses	Sim	Sim				
Poliomielite (vírus inativados)		Três doses iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO	Vacinar os não vacinados anteriormente	REFORÇO	Vacinar pessoas em situações especiais de risco							Sim, três primeiras doses e reforço aos 15 meses	Sim	Sim			
Pneumocócicas Conjugadas		Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada – VPC20, VPC15, VPC13 ou VPC10 (PNI) –, iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO	VPC20, VPC15, VPC13 ou VPC10 (PNI): vacinar os não vacinados anteriormente				VPC20, VPC15 ou VPC13: vacinar pessoas em situações especiais de risco			VPC20, VPC15, VPC13: uma dose		Sim, VPC10, menores de 5 anos	Sim	Sim, VPC10 e VPC13			
Pneumocócica 23 -Valente															Vacinar pessoas em situações especiais de risco					Uma dose	Duas doses com intervalo de cinco anos		Não	Sim	Sim		
Meningocócica Conjugada ACWY ou C		Duas doses iniciando aos 3 meses de idade										REFORÇO				REFORÇO			Para não vacinados até 15 anos, duas doses com intervalo de cinco anos. A partir de 16 anos, uma dose.	Vacinar pessoas em situações especiais de risco		Sim, menC aos 3 e 5 meses, menACWY no reforço aos 12 meses e para 11-14 anos	Sim	Sim, menC e menACWY			
Meningocócica B		Duas doses iniciando aos 3 meses de idade										REFORÇO	Para os não vacinados anteriormente: duas ou três doses de acordo com a faixa etária e a vacina utilizada							Vacinar pessoas em situações especiais de risco		Não	Sim	Não			
Influenza (gripe)							VACINAÇÃO ANUAL																		Sim, trivalente para menores de 5 anos e maiores de 60 anos	Sim, tri ou tetravalente e HD4V (60 anos ou +)	Sim, trivalente
Febre Amarela											Duas doses: aos 9 meses de vida e aos 4 anos de idade. Recomendação do PNI: se recebeu a primeira dose antes dos 5 anos, é indicada uma segunda dose, independentemente da idade atual. Se aplicada a partir dos 5 anos: dose única. Recomendação da SBIm: duas doses. Como há possibilidade de falha vacinal mesmo para quem receber a primeira dose a partir dos 5 anos, a SBIm recomenda uma segunda dose dez anos após. Essa vacina pode ser exigida para emissão do CIVP, atendendo exigências sanitárias de alguns destinos internacionais. Neste caso, deve ser aplicada até dez dias antes de viajar.														Sim	Sim	Não
Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola)											Duas doses a partir dos 12 meses			Vacinar os não vacinados anteriormente							Vacinar pessoas em situações especiais de risco		Sim, até 59 anos	Sim	Não		
Varicela (catapora)											Duas doses a partir dos 12 meses			Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente							Vacinar pessoas em situações especiais de risco		Sim	Sim	Sim		
Hepatite A											Duas doses a partir dos 12 meses			Vacinar os não vacinados anteriormente							Vacinar pessoas em situações especiais de risco		Sim, uma dose para menores de 5 anos	Sim	Sim		
HPV**																Duas doses com intervalo mínimo de seis meses entre elas			Vacinar adultos com três doses (0-1 a 2-6 meses)	A critério médico, vacinar pessoas em situações especiais de risco com três doses (0-1 a 2-6 meses)			Sim, uma dose de HPV4 para meninas e meninos de 9 a 14 anos	Sim, HPV9	Sim, três doses de HPV4 para mulheres e homens até 45 anos pertencentes a grupos especiais		
Herpes Zoster																		Duas doses, dois meses de intervalo. A partir dos 18 anos, vacinar pessoas em situações especiais de risco		Duas doses, dois meses de intervalo. Rotina a partir dos 50 anos			Não	Sim	Não		
Dengue***																Qdenga® é a vacina preferencial, recomendada entre 4 e 60 anos, independentemente de contato prévio com o vírus da dengue – duas doses com intervalo de três meses entre elas. Dengvaxia® é recomendada entre 6 e 45 anos, somente para soropositivos para dengue – três doses com intervalo de seis meses entre elas.							Sim, Qdenga® para 10 a 14 anos	Sim	Não		
Covid-19	Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19																										
VSR	Nirsevimabe – Dose única para < 8 meses na primeira sazonalidade											Imunizar crianças em situações especiais de risco								Vacina VSR****- Uma dose		Não	Sim	Não			

01/07/2025 – Orientações, esquemas de doses e comentários devem ser consultados nos Calendários de vacinação SBIm 2025/2026 e nos Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais.

*Consultar manual do CRIE em <https://sbim.org.br/images/calendarios/manual-dos-centros-de-referencia-para-imunobiologicos-especiais-6a-edicao-2023.pdf> (acesso em 23.05.2025).

Para pacientes com determinadas doenças crônicas e sob orientação médica, consultar os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais*.

**Esquemas para menores de 20 anos. PNI: HPV4 uma dose dos 9-14 anos. SBIm: HPV9 duas doses dos 9-19 anos e três doses de 20 anos em diante.

***Notas técnicas do MS: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dengue/notas-tecnicas>

**** Arexvy® (GSK) e Abrysvo® (Pfizer) uma dose, aplicar a qualquer momento, independentemente da sazonalidade. Em idosos de 60-69 anos, em condições de risco e de rotina para ≥ 70 anos. / Ambas são recomendadas dos

50-59 em condições de risco aumentado para a doença. Abrysvo® (Pfizer) é licenciada pela ANVISA dos 18 anos em diante para pessoas em condições de risco. Dos 18 aos 49 anos, nessas situações, uso a critério médico.

Rotina

Vacinar não vacinados

Situações especiais

Contraindicada